


Programme de vaccination scolaire pour les élèves de la 7e année



La Santé publique de la région de York offrera des vaccins gratuits aux élèves de la 7e année dans l'établissement de votre enfant, notamment le vaccin méningococcique ACWY (ACWY-135), le vaccin contre l'hépatite B, et le vaccin HPV-9. Ces vaccins protègent les enfants contre des maladies graves et aident à prévenir la propagation des maladies infectieuses au sein de votre communauté scolaire. Chaque école organisera les campagnes de vaccinations en deux temps, avec une première dose cet automne et une seconde au printemps. Consultez le lien

<https://www.york.ca/health/immunizations/school-immunization-program> pour connaître la date du rendez-vous de votre enfant à la clinique

Le vaccin contre le méningocoque ACWY-135 est obligatoire pour que les élèves puissent fréquenter l'établissement. Les vaccins contre l'hépatite B et le VPH sont vivement recommandés pour protéger votre enfant, mais ils ne sont pas obligatoires pour fréquenter l'établissement.

- Pour soumettre votre carnet de vaccination en ligne, vous devez vous rendre sur le portail Connexion immunisations Ontario (CION/ICON).
- Pour plus d'informations, consultez le site www.york.ca/immunization ou appelez le service de santé publique de la région de York au 1-877-464-9675, poste 73456

VOUS AVEZ MANQUÉ UNE SÉANCE DE VACCINATION EN MILIEU SCOLAIRE ?

Si votre enfant a manqué la séance de vaccination à l'école, il peut recevoir ces vaccins de 7e année — ainsi que d'autres vaccins de routine — dans un centre de vaccination communautaire des Services de santé publique de la région de York. Les élèves de la 8e à la 12e année qui n'ont pas reçu leurs vaccins de 7e année peuvent également se faire vacciner gratuitement dans ces cliniques. Prenez rendez-vous sur www.york.ca/immunization (disponible 30 jours à l'avance).




Rendez-vous sur [york.ca/form/immunization-consent](https://www.york.ca/form/immunization-consent) pour remplir dès que possible le formulaire

Soumettre sa demande à l'avance garantit une bonne planification. Il n'y a pas de date limite : vous pouvez soumettre le formulaire à tout moment jusqu'au jour de la campagne de vaccination de votre enfant inclus. Une fois soumis, le consentement s'applique à la fois aux doses de l'automne 2026 et du printemps 2027, sauf si vous choisissez de le retirer.

Conditions d'éligibilité et détails sur les doses

Vaccination de rattrapage pour les élèves	Automne 2026	Printemps 2027
Méningocoque ACYW-135 (obligatoire pour fréquenter l'établissement)	dose unique	
Virus du papillome humain (HPV)	1re dose	2e dose
Hépatite B		



Si vous avez des questions, veuillez appeler notre ligne d'information sur les vaccins au 1-877-464-9675 poste 73452 ou envoyer un courriel à vaccineinformationline@york.ca

À QUOI S'ATTENDRE LE JOUR DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION À L'ÉCOLE

Certains élèves peuvent recevoir jusqu'à trois vaccins en une journée. Ceci est sûr, efficace et protège votre enfant le plus tôt possible. Si votre enfant a de la fièvre le jour de la consultation, reportez la vaccination jusqu'à ce qu'il se sente mieux.

Avant	Pendant	Après
 Prenez une collation	 Respirez lentement et profondément, et détendez votre bras	 Vous avez réussi ! Il est recommandé d'attendre 15 minutes après la vaccination pendant que les infirmières surveillent les élèves pour détecter d'éventuelles réactions immédiates.
 Portez un haut ample à manches courtes	 Distrayez-vous — pensez à des choses agréables !	 La plupart des effets secondaires sont légers et disparaissent d'eux-mêmes, comme une douleur ou un bras rouge, un gonflement ou une légère fièvre. Les effets secondaires graves sont rares

Consultez le site york.ca/health/immunizations/school-immunization-program ou adressez-vous à un professionnel de santé avant de faire vacciner votre enfant si celui-ci présente un système immunitaire affaibli ou a déjà eu une réaction allergique grave (par exemple, une anaphylaxie) à un vaccin ou à l'un de ses composants, tels que la levure, l'aluminium, le latex, le chlorure de sodium, l'histidine, le polysorbate 80, le borate de sodium ou le thimérosal.

▶ **L'hépatite B** est un virus qui peut causer de graves dommages au foie et un cancer du foie. Il n'existe aucun remède. Si la plupart des personnes guérissent, certaines deviennent des porteuses chroniques et constituent un réservoir actif pour la transmission. La maladie se transmet d'équipements de tatouage ou de spa mal nettoyés.

▶ **Le vaccin contre l'hépatite B** (Engerix-B® ou Recombivax HB®) induit une protection de plus de 95 % et confère une immunité de très longue durée. En Ontario, le vaccin offert est gratuitement pour les élèves de la 7e à la 12e année. La plupart des élèves ont besoin de deux doses administrées à six mois d'intervalle, ou de trois doses s'ils commencent la vaccination à partir de 16 ans.

▶ **Le papillomavirus humain (HPV)** est un groupe de virus courants et contagieux pouvant provoquer des cancers du col de l'utérus, de la bouche, de la tête, du cou et des organes génitaux. La majorité des personnes non vaccinées contractent le HPV à un moment ou à un autre, souvent sans présenter de symptômes, et peuvent donc le transmettre à d'autres sans le savoir. Il se transmet par contact cutané étroit, y compris par contact sexuel.

▶ **Le vaccin contre le HPV-9** (Gardasil 9®) protège contre neuf souches responsables de la plupart des cancers liés au HPV et des verrues génitales, prévenant environ 90 % de ces maladies chez les hommes et les femmes. Le vaccin est le plus efficace lorsqu'il est administré avant l'exposition au VPH, c'est pourquoi il est recommandé de le faire dès le plus jeune âge. En Ontario, le vaccin est gratuit pour les élèves de la 7e à la 12e année. La plupart des élèves ont besoin de deux doses administrées à six mois d'intervalle.

▶ **La méningococcie** est une maladie grave, mais rare causée par une bactérie qui peut infecter les membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière ou le sang. Les symptômes peuvent apparaître soudainement et mettre la vie en danger en quelques heures. Certains survivants peuvent faire face à des séquelles durables. Bien que cela soit rare au Canada, les adolescents et les jeunes adultes sont plus susceptibles d'être touchés. Les bactéries se propagent par contact direct avec la salive ou les sécrétions, comme en embrassant ou en partageant des boissons, des couverts, des brosses à dents ou des cigarettes électroniques.

▶ **Le vaccin contre le méningocoque C-ACWY-135** (Nimenrix®, Menveo®, Menquadfi®) protège contre quatre types de bactéries. En Ontario, une dose du vaccin contre le méningocoque est systématiquement administrée à l'âge de 12 mois, ainsi qu'aux élèves de la 7e à la 12e. Les deux doses sont obligatoires pour la scolarisation en vertu de la Loi sur la vaccination des élèves (immunisation des élèves), sauf si une exemption valide est présentée.

