

七年級學校免疫接種計劃

約克區公共衛生局 (York Region Public Health) 將為您子女所在學校的七年級學生提供免費疫苗接種服務, 包括 C-ACYW-135 型腦膜炎球菌疫苗、乙型肝炎 (乙肝) 疫苗以及人類乳頭瘤病毒疫苗 (HPV-9)。這些疫苗能夠保護兒童免受嚴重疾病的侵害, 並有助於防止傳染病在校園社區內傳播。每所學校將安排兩次疫苗接種——一次在今年秋季, 一次在明年春季。

請在 york.ca/health/immunizations/school-immunization-program 查詢您子女的疫苗接種日期。

學生入學必須接種 ACYW-135 型腦膜炎球菌疫苗。強烈建議接種乙型肝炎疫苗和 HPV 疫苗以保護您的子女, 但並非入學強制要求。

- 若要在線上提交免疫接種記錄, 請造訪 Immunization Connect Ontario (ICON)
- 如需更多資訊, 請瀏覽 www.york.ca/immunization 或致電約克區公共衛生局, 電話: 1-877-464-9675 轉 73456

錯過學校疫苗接種?

若您的子女錯過學校的疫苗接種, 可前往約克區公共衛生局的社區診所, 接種這些七年級疫苗以及其他常規疫苗。錯過七年級疫苗接種的八至十二年級學生也可在這些診所免費補種。如需預約, 請瀏覽 www.york.ca/immunization (可提前 30 天預約)。



請瀏覽 york.ca/form/immunization-consent, 儘快填寫學校疫苗接種電子同意書。

儘早提交有助於我們制定相關計劃。未設截止日期——您可隨時提交同意書, 最晚可至您子女所在學校的疫苗接種當日 (含當日)。一旦提交, 該同意書即適用於 2026 年秋季和 2027 年春季的劑次, 除非您選擇撤回同意。

疫苗接種資格及劑次詳情

學生疫苗	2026 年秋季	2027 年春季
ACYW-135 型腦膜炎球菌疫苗 (入學必需)	一劑	
人類乳頭瘤病毒疫苗 (HPV)	第 1 劑	第 2 劑
乙型肝炎疫苗		



如有任何疑問, 請致電我們的疫苗接種資訊熱線, 電話: 1-877-464-9675 轉 73452, 或發送電子郵件至 [email vaccineinformationline@york.ca](mailto:vaccineinformationline@york.ca)

學校疫苗接種日須知

部分學生一天內可能須接種多達三種疫苗。這種做法安全而有效，可以儘早為您的子女提供保護。若您的子女在接種日出現發燒症狀，請暫緩接種疫苗，待其身體康復後再接種。

接種前	接種中	接種後
 吃點零食	 緩慢深呼吸，放鬆手臂	 你做到了！接種後需留觀 15 分鐘，在此期間，護士將監測學生是否出現任何急性反應
 穿寬鬆的短袖上衣	 分散注意力——想些開心的事情！	 大多數副作用都較為輕微，會自行消退，例如手臂酸痛或發紅、腫脹，或輕微發熱。嚴重副作用非常罕見

若您的子女免疫系統較弱，或曾對疫苗及其任何成分(例如酵母、鋁、乳膠、氯化鈉、L-組胺酸、聚山梨醇酯 80、硼酸鈉 或硫柳汞)發生嚴重的過敏反應(即過敏症)，請在接種疫苗前瀏覽 york.ca/health/immunizations/school-immunization-program 或諮詢醫療服務人員。

乙型肝炎是一種可能導致嚴重肝損傷甚至肝癌的病毒。目前尚無治癒方法。雖然大多數感染者能夠康復，但仍有一部分人會終身攜帶病毒，並將其傳染給他人。該病毒的傳播途徑包括：受感染的血液或體液，例如共用針頭、刮鬍刀或牙刷；性接觸；或消毒不徹底的紋身或水療設備。

乙型肝炎疫苗 (Engerix-B® 或 Recombivax HB®) 的有效性超過 95%，並提供長效保護。在安大略省，七至十二年級的學生可免費接種此疫苗。大多數學生需要接種兩劑，兩劑之間需間隔六個月。若在 16 歲之後(含 16 歲)開始接種，則僅需接種三劑。

人類乳頭瘤病毒(HPV)是一種常見的傳染性病毒，包含多種型別，可引發子宮頸、口腔、頭部、頸部及生殖器部位的癌症。大多數未接種疫苗的人在某種程度上都會感染 HPV，且通常沒有任何症狀，因此他們可能在不知情的情況下將病毒傳染給他人。人類乳頭瘤病毒透過密切的皮膚接觸傳播，包括性接觸。

九價 HPV 疫苗(Gardasil 9®)可預防導致大多數 HPV 相關癌症及生殖器疣的九種毒株，能夠預防男性和女性中約 90% 的此類疾病。在接觸 HPV 前接種疫苗效果最佳，因此，建議在年輕時接種。在安大略省，七至十二年級的學生可免費接種此疫苗。大多數學生需要接種兩劑，兩劑之間需間隔六個月。

腦膜炎球菌病是一種嚴重但罕見的疾病，由細菌引起，這些細菌可以感染大腦和脊髓的內膜或血液。症狀可能會突然出現，並在數小時內危及生命。部分倖存者可能會留下長期的健康問題。儘管腦膜炎球菌病在加拿大並不常見，但青少年和年輕人的感染風險相對較高。腦膜炎球菌主要透過與唾液或黏液的密切接觸傳播，例如接吻，或共享飲料，共用餐具、牙刷或電子煙。

C-ACYW-135 型腦膜炎球菌疫苗 (Nimenrix®, Menveo®, Menquadfi®) 可預防四種類型的腦膜炎球菌。在安大略省，除了七至十二年級的學生外，滿 12 個月大的幼兒通常也需接種一劑腦膜炎球菌疫苗。根據《學校學生防疫注射法令》(Immunization of School Pupils Act) 的規定，除非提供有效的豁免證明，否則學生必須接種兩劑疫苗方可入學。

